



为世界各地的人们创造更健康的环境



扫码关注公众号
随时随地为您充电

萤熵环境科技(上海)有限公司
安蔚优中国
上海市静安区昌平路363号1幢4层
服务热线:4001868282
邮政编码:200040



得绿多®





春季防病壮根
夏季管理安心

· 长效 · 快速 · 促根



得绿多®



产品相关信息

总有效成分含量:30%

有效成分及其含量:戊唑醇20%, 肟菌酯10%

剂型:悬浮剂

毒性:低毒

登记相关信息

农药登记证号:PD20210050

原产地:澳大利亚

登记证持有人:拜耳有限责任公司

得绿多®是一款由甲氧基丙烯酸酯类化合物肟菌酯和三唑类化合物戊唑醇复配而成的专业杀菌产品。既可快速作用于植物表面,也可通过植物的叶片和根系吸收并在体内快速传导,兼具强大的保护和治疗作用。该产品起效迅速、持效期长,更能促进植物根部生长,可用于多种草坪常见病害和观赏植物病害的防治。



产品特点

防治谱广

一种产品适用于不同场景下多种病害的防治。可有效防治多种草坪常见病害,如褐斑病、币斑病、炭疽病、叶斑病、红丝病、锈病及雪霉叶枯病;也可用于防治如玫瑰白粉病、黑斑病、杜鹃花瓣枯萎病等多种观赏植物病害。

双效作用

由两种不同作用机制的有效成分复配而成,兼具触杀和内吸作用,由内而外为植物提供双重保护。



快速见效

施药一周后即可见效。


促进植物健康

可为夏季压力下的草坪提供更多保护。多次使用后可有效促进植物根部生长及叶绿素含量增加。


制剂技术独特

产品分布更均匀,渗透更高效,且耐雨水冲刷。一旦药液在植株表面干燥,降雨将不会影响产品的效果。使用更省心,效果更出色。


戊唑醇晶体被吸收到蜡质层中



肟菌酯晶体作用于表面




大雨前后,的得绿多®有效成分晶体在植物叶片表面的显微照片状态(施药30分钟后降雨)



C14标记:图片显示,在历经持续降雨一小时后,得绿多®仍在植物叶片中表现出优秀的内吸活性。

防治效果



使用得绿多®后的镰刀枯萎病病斑(图片拍摄于施药后第47天)



广州某高尔夫球场,施用得绿多®五次后果岭根系长度以及密度得到明显改善

施药时间

- 可全年使用(注:夏季高温高湿条件下,请根据草坪状况适当降低使用频率,并咨询技术人员)
- 最佳使用期为病害发生前,或是病害症状刚刚出现时

北方

一月 二月 三月 四月 五月 六月

七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

南方

一月 二月 三月 四月 五月 六月

七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

注: ■ 正常使用 ■ 咨询使用

使用场景和方法

适用场景

运动用草坪(高尔夫球场、网球场等)、公园草坪、景观园艺、草坪种植基地及机场、住宅区、商业区、购物中心、游乐场等处的绿化带草坪。

防治对象	制剂用药量
币斑病、褐斑病	1.8~3.6升/公顷

施用方式	用水量
喷雾	800~1600升/公顷

适用场景

(食用)玫瑰。

防治对象	制剂用药量
白粉病	30~40毫升/亩

施用方式	用水量
喷雾	30~50升/亩

注意事项及使用技巧

- 为取得理想的防治效果,应在病害发生前或病害症状刚出现时施药。用于草坪时,施药间隔期为10-15天;用于玫瑰时,施药间隔期为10天。
- 用于防治草坪褐斑病时,可提升用水量,使药液与草坪草根际充分接触。
- 用于食用玫瑰的病害防治,每季最多用药2次,安全间隔期为7天。
- 施药后需等待药液干燥后再进行灌溉或修剪等活动,以防止药剂损失,确保药效。
- 实地测试中发现,暖季型草坪草(如狗牙根、海滨雀稗)在夏季高温时连续施用本产品将抑制草坪草叶片生长,同时可促进根系生长。请根据对草坪草的具体生长要求酌情施药。

