

900

800

700

600

500

400

300

200



AquaPy®

INSEKTMIDDEL

- ✓ Til bekjempelse av flygende, krypende og kravlenende insekter.
- ✓ Kun for profesjonell bruk.

Chrysanthemum cinerariaefolium,
ekstrakt..... 30 g/l (3%)
Piperonylbutoxid ... 135 g/l (13,5%)

P.nr 304516

Innhold:

1 L e

Fluer, Møll & Biller



7 038090 813142



ADVARSEL

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Inneholder 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/2-Methyl-isothiazol-3-on.
Kan gi en allergisk reaksjon.
Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
Innhold/beholder leveres til mottak for farlig avfall.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

N084981974C - ARTICLE 80481314

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Danmark
Telefon: +45 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.no

Bayer

Produksjonsdato: Se emballasje

AquaPy®**Insektmiddel,**

Til bekjempelse av flygende, krypende og kravlende insekter.
Kun for profesjonell bruk.

Advarsel**ADVARSEL**

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Inneholder 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/2-Methyl-isothiazol-3-on.
Kan gi en allergisk reaksjon.
Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
Innhold/beholder leveres til mottak for farlig avfall.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

AquaPy® brukes til bekjempelse av insekter i levnedsmiddelindustrien, på produktlagre og andre steder der insektkontroll er ønskelig.

AquaPy® er en emulsjon i vann og er klar til bruk i ULV-aerosolutstyr ("ultra-low-volume").

AquaPy kan tynnes ut i vann for direkte påsprøyting/overflatesprøyting, tåkesprøyting eller spres med termisk fordampningsutstyr.

AquaPy® er et langsomt fordampende middel med svak lukt som inneholder ekstrakt av Chrysanthemum cinerariaefolium) som aktivt stoff og piperonylbutoxid som synergist.

AquaPy® virker raskt og dreper effektivt og har en frastøtende virkning som tvinger insektene ut fra tilholdsstedene/gjemmestedene sine.

Bruksområder

Rombehandling og direkte påsprøyting (overflatesprøyting) til bruk mot følgende insekter og på følgende lokaliteter:

Insekter

Flygende insekter: Fluer, Mygg, Møll inkl. Klesmøll og Tofarget frøsmøll og tobakksbiller m.fl. Veps bekjempes ved direkte behandling i og ved vepsebolet.

Kravlende insekter: Til bekjempelse av kravlende og krypende insekter, for eksempel kakerlakker, veggglus, lopper, voksne kornsnutebiller, riselbiller og tobakksbiller mfl.

Lokaliteter

Forbruker: Private hjem.

Mathåndtering: restauranter, storkjøkken og slakterier. Distribusjonslagre for matvarer, råvarelagre, kornlagre, staller, tobakkslagre mfl.

Offentlige bygninger: sykehus, hoteller, offentlige badeanlegg, kommunale bygninger, kirker, haller, shoppingssentre, kinoer osv.

Landbruksbygninger, staller: hønsehus, fjøs, melkestaller, grisehus osv.

Utendørs: avfallscontainere, renseanlegg (men ikke på selve filterenhetene), fritidsområder osv.

Merk!

På bebodde områder bør produktet bare brukes punktvis i revner og sprekker.

AquaPy vil under normale forhold ikke skade stoff/tepper og normalt anvendte farger, men det anbefales å lage et testområde i liten skala før behandlingen ved eventuelt å gni en dråpe av produktet på materialet og se om produktet farger av.

AquaPy må ikke brukes på bekledningsutstyr eller sprøytes direkte på korn i kornlagre eller på fôr i fôrsiloer.

Det må ikke sprøytes direkte på husdyrene.

Levnedsmidler og fôr må ikke forurennes.

Sprøyting/oppblanding

Maksimal effekt oppnås ved en temperatur på over 10°C under utsprøytingen.

Avhengig av ønsket bruk fortynnes AquaPy med vann (for ULV-aerosol behandling brukes væsken ufortynnet).

Bland opp sprøytevæske etter behov.

Rist flasken godt før oppblanding.

Sprøytevæske må ikke lagres, bland aldri mer enn nødvendig.

Innendørs termisk fordampning/tåkesprøyting

Lukk dører og vinduer og steng ventilasjonen før utsprøyting og i minst 30 minutter etter behandlingen.

Fordel sprøytetåken jevnt i hele rommet.

Behandlingen bør gjennomføres i insektenes flyveperiode.

For tobakksbiller vil det vanligvis være sent på ettermiddagen og om kvelden.

Sørg for god dekning av insektenes tilholdssteder og gjemmesteder.

Sprøyt så ofte som nødvendig.

Hyppigere behandling enn én gang i uken anbefales ikke fordi det vil fremme utvikling av resistens.

Direkte påsprøyting (flatebehandling)

Brukes som en flatebehandling til å bekjempe insekter på gulv, i og omkring kasser og sekker, i revner og sprekker i lagerbygninger, kornlagre, møller, bakerier eller tilsvarende.

Sprøyt så ofte som nødvendig.

Mot veps

Sprøyt direkte i vepsebolet eller gjennom inngangen til bolet. For skjulte vepsebol tilføres AquaPy helt til bolet er mettet med sprøytevæske.

Behandlingen bør utføres etter solnedgang eller når vepsenes aktivitet er minimal.

Flatebehandling:		
Innendørs og utendørs direkte påsprøyting	Flygende insekter , f.eks. fluer, mygg, møll (klesmøll og tofarget frømøll) mfl.	125 ml AquaPy blandet med 4875 ml vann (2,5 % blanding) per 100 m ² (37,5 mg PY/m ²)
	Krypene og kravlene insekter , f.eks. kakerlakker, voksne kornsnutebiller, tobakksbiller, vegglus, lopper mfl.	500 ml AquaPy blandes med 4500 ml vann (10 % blanding) per 100 m ² (150 mg PY/m ²)
Rombehandling:		
Termisk fordamping/tåkesprøyting	Flygende insekter, f.eks. fluer, mygg, møll (klesmøll og tofarget frømøll) mfl.	200 ml AquaPy blandes med 800 ml vann (20 % blanding) per 3000 m ³ (2 mg PY/m ³).
	Krypene og kravlene insekter , f.eks. kakerlakker, lopper, voksne kornsnutebiller, tobakksbiller mfl.	600 ml AquaPy blandes med 400 ml vann (60 % blanding) per 3000 m ³ (6 mg PY/m ³)
Ultralavt volum, ULV	Flygende insekter, f.eks. fluer, mygg, møll (klesmøll og tofarget frømøll) mfl.	200 ml uforynnnet AquaPy per 3000 m ³ (2 mg PY/m ³)
	Krypene og kravlene insekter , f.eks. kakerlakker, lopper, voksne kornsnutebiller, tobakksbiller mfl.	600 ml uforynnnet AquaPy per 3000 m ³ (6 mg PY/m ³).

PY = Pyrethrum =Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt

Sprøyteutstyr

ULV-aerosol sprøyting:

Bruk en egnet aerosol generator som kan produsere og fordele dråper med en maksimum gjennomsnittlig diameterverdi på 50 µm og gjerne under 25 µm.

Termisk fordamping/tåkesprøyting:

Sprøytes ut med en egnet hånddrevet eller mekanisk eller elektrisk drevet sprøyte som kan produsere en fin dis eller tåke.

Ved bruk av vannbaserte midler er det viktig at sprøyten har riktig innstilling. Dette kan kreve bruk av tåkerør med høy ytelse.

Kontakt-/flatebehandling:

Påføres med en egnet hånddrevet eller mekanisk eller elektrisk drevet sprøyte som kan produsere store dråper.

Mot kravende insekter brukes bare utstyr som kan stilles inn på store dråper.

Hvis en sprøtetåke skal anvendes, som gir en "utskyllingseffekt" på kravende insekter, brukes vanligvis tilgjengelig sprøyteutstyr, og det sprøytes under høyt trykk og med små dyser.

Rengjøring av sprøyteutstyret

Skyll sprøyteutstyret med vann umiddelbart etter bruk.

Oppbevaring

Oppbevares tørt og frostrfritt.

Ristes før bruk.

AquaPy kan lagres i inntil 2 år etter produksjonsdatoen i tett lukket originalemballasje.

Den tomme emballasjen

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Sikkerhetsforanstaltning

Bruk nitril- eller PVC-hansker, vernebriller, beskyttelsesdrak, støvler og halv maske med partikkelfilter A2/P2 under behandlingen.

Førstehjelp

Generelt : Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritasjon av hud og øyne må leges straks oppsøkes.

Innånding: Før den forgiftede personen ut i frisk luft (unngå nedkjøling).

Hud: Fjern gjennomvåte klær. Vask med såpe og vann hvis stoffet kommer i kontakt med huden.

Øyne: Hvis stoffet kommer i øynene, må det straks skylles grundig med vann.

Inntak: Skyll munnen grundig og drikk rikelig med vann.

Fremkall gjerne brekninger.

Kontakt lege omgående, og vis denne beholderen eller etiketten.



AquaPy®

INSEKTMIDDEL

- ✓ Til bekjempelse av flygende, krypende og kravlende insekter.
- ✓ Kun for profesjonell bruk.

Chrysanthemum cinerariaefolium,
ekstrakt..... 30 g/l (3%)
Piperonylbutoxid ... 135 g/l (13,5%)

P.nr 304516

Fluer, Møll & Biller



Innhold:

1 L e



ADVARSEL

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Inneholder 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one/2-Methyl-isothiazol-3-on.
Kan gi en allergisk reaksjon.
Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
Innhold/beholder leveres til mottak for farlig avfall.
Oppbevares utilgjengelig for barn.



N084981974C - ARTICLE 80481314

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Danmark
Telefon: +45 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.no

Bayer

Produksjonsdato: Se emballasje