



FARE

Ekstremt brannfarlig aerosol.

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Kan gi forsterskader.

Kan forårsake organskader (Blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Innhent særskilt instruks før bruk.

Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

Vask hendene grundig etter bruk.

Unngå utslipp til miljøet.

Samle opp spill.

Oppbevares innelåst.

Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.

Ikke innånd damp/aerosoler.

Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.

Innhold/holder leveres til godkjent avfallsmottak.



NO07112017_81767068 - ARTICLE 80926081

Deklarasjon:

Formuleringstype: Skum

Aktivt stoff: kumatetralyl 0,4032 vekt%

Andet: Isotridecanol, etoksylert 1,8 vekt%

Godkjenningsnummer: NO-2014-0089

Batchnr. og produksjonsdato:
Se under etiketten.
Produktet er minimum holdbart
4 år fra produksjonsdato

Bayer

Innehaver av godkjenning:

Bayer A/S

Arne Jacobsens Allé 13

DK-2300 København S

Danmark

Telefon: +45 45 23 50 00

www.environmentalscience.bayer.no

RACUMIN FOAM

Slik virker det

Gnagerens pels kommer i kontakt med skum-produktet, og når den senere steller pelsen, får den i seg den aktive substansen. Inneholder Bitrex® et stoff som gir bitter smak, samt et fargestoff.

Bruk

Racumin® Foam skal kun brukes innendørs og på steder som er utilgjengelige for barn og dyr som ikke er i målgruppen (f.eks. lukkede kabelkanaler, innredning med bl.a. elektriske apparater eller høyspenningsskap, hulrom i vegger og kledning, innganger til rottehull, veggåpninger, trange passasjer, områder med falsk tak, isoleringsvegger, servicesjakter, installasjonssjakter, bjelke- eller forskalingsstrukturer).

Racumin® Foam skal kun brukes under svært spesielle forhold, dersom ikke-kjemisk bekjempelse og vanlige åteformuleringer ikke anses som effektive.

Advarsel

Av brannforebyggende grunner har skummet en vannbasert formulering. Må ikke påføres ubeskyttede elektriske kontakter. Kabelisolasjon kan bli skadet på grunn av gnageraktivitet: Fare for elektrisk støt. Informer personer som berøres av gnager-bekjempelsen før bekjempelsen starter i overensstemmelse med god etablert praksis. Det skal også informeres om tiltak i tilfelle forgiftning, feil påføring av skummet eller ved funn av døde gnagere.

Behandlingssteder må merkes med følgende informasjon: "inneholder rottegift", "produktets navn", "virkestoff(er)" og "i tilfelle uhell kontakt Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00).

Racumin® Foam brukes som en del av et integrert system for skadedyrbekjempelse (IPM-system) inkludert blant annet hygienetiltak og, om mulig, fysiske bekjempsesmetoder. Racumin® Foam brukes primært som en tilleggskbekjempelse til normal åtebekjempelse. Ved høy luftfuktighet (muggrisiko for vanlige åter), når det finnes attraktive alternative fødkilder eller ved åteskrekke, er effektiv bekjempelse mulig med Racumin® Foam.

Merck

Fjern mat som er lett tilgjengelig for gnagere (bl.a. spilt korn eller matavfall).

Bortsett fra dette skal du ikke rydde opp i området som er angrepet like før behandlingen, da det bare vil forstyrre gnagerpopulasjonen og gjøre det vanskeligere å få åten akseptert. Produktet skal være romtemperert og ristes til blande-kulen inni flasken høres tydelig. Skummet sprayes ut og holder seg i flere dager. Munnstykket kan rengjøres med vann om nødvendig etter behandling.

Doseringsveiledning

Ved bekjempelse av mus: Påfør 4 til 30 g skum per hull/passasje. Ved bekjempelse av rotter: Påfør 20 til 30 g skum per hull/passasje.

Hullet skal ikke fylles helt med skum, for at dyrene fremdeles skal kjenne igjen sine vanlige stier og passasjer. Hvis hullet er helt fylt med skum, kan dyrene nøle med å passere. Antallet behandlingpunkter avhenger av utformingen av lokalene eller bygningen.

Det anbefales to påføringer per behandlingstiltak.

Hyppigheten av besøk til det behandlede området bestemmes etter operatørens skjønn på bakgrunn av undersøkelsen som ble utført ved starten av behandlingen. Denne hyppigheten skal samsvare med anbefalingene som er gitt i relevante retningslinjer for beste praksis.

På grunn av forsiknelsen i virkemåten kan det ta fra 4 til 10 dager før rottegift med antikoagulasjonsmiddel har effekt etter faktisk inntak av produktet.

Resistens

Vurder resistenssituasjonen i populasjonen før valg av rottegift. Ikke bruk antikoagulant muse- og rottegift som permanent lok-kemat eller til intervallutlegging.

Produkter skal ikke brukes mer enn 35 dager uten å evaluere angrepet status og behandlingens effekt. For å forebygge resistens må det ikke byttes til et antikoagulerende middel med tilsvarende eller lavere styrke. Ved bytte av produkter bør det vurderes å bruke et ikke-antikoagulant middel, eller hvis tilgjengelig, en mer potent antikoagulant.

Forsiktighetsregler

For å unngå rester i mat og dyrefôr skal det holdes en avstand på minst 2 m til steder der mat og dyrefôr oppbevares, tillages og spises når produktet brukes.

Behandlede områder i bygninger skal sikres for å hindre tilgang for barn og kjæledyr.

Under bruk av produktet skal du ikke spise, drikke eller røke. Vask hender og direkte eksponert hud etter bruk av produktet. Vernebriller skal brukes under behandling og rengjøring av skum. Bruk av hansker er obligatorisk. Hansker av Nitril gummi (min. 0,40 mm, EN388/EN374, kat.III) skal brukes under behandling og rengjøring av skum. Skumrester kan tørkes av med et tørt papirhåndkle.

Gnagere kan være sykdomsbærere. Ikke berør døde gnagere med bare hender. Bruk hansker eller verktøy, for eksempel en tang, når de avhendes.

Lagring

Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Beholderen skal holdes lukket og ikke utsettes for direkte sollys. Oppbevares utilgjengelig for barn, fugler, kjæledyr og gårdsdyr.

Holdbarhet: 48 måneder

Avfallshåndtering

Når bekjempelsen avsluttes skal resterende åte og emballasje leveres til godkjent avfallsmottak.

Emballasje uten rester av muse-/rottegift kan leveres til gjenvinning.

Døde mus og rotter skal samles opp med en gang, pakkes forsvarlig inn og kastes i restavfallet.

Førstehjelp

Dette produktet inneholder et antikoagulasjonsmiddel. Hvis det svelges, kan symptomene, som kan oppstå senere, omfatte ne-seblødning og blødning i tannkjøttet. I alvorligere tilfeller kan det forekomme blåmerker, og det kan være blod i avføring og urin.

Motgift: Vitamin K1 (gis under tilsyn av lege/veterinær).

Kontakt Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) **for nærmere anbefaling om behandling.**

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. **VED KONTAKT MED ØYNENE:** Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

HUDKONTAKT: Vask huden med vann og deretter med såpe og vann.

MUNNKONTAKT: Skyll munnen nøye med vann.

- Gi aldri en bevisstløs person noe i munnen.

- Ikke fremkall brekninger.

- Hvis produktet blir svelget, søk råd hos lege umiddelbart og vis frem produktets beholder eller merking.

Kontakt veterinær hvis et kjæledyr har svelget produktet.

Ved plassering av skum i nærheten av vannavløpssystemer må du påse at produktet ikke kommer i kontakt med vann. Skadelig for dyrelivet.

Les og følg produktinformasjonen samt annen informasjon som følger med produktet eller som gis på salgsstedet, før du bruker produktet.